雀艾斯达的二氧化氯技术（ClO_2）



JET 表面消毒液采用与 Tristel 雀艾斯达医疗器械去污产品相同的二氧化氯 ClO_2 技术。**JET 表面消毒液**包含两个独立腔室，分别装有基液（柠檬酸）和激活液（亚氯酸钠）。

按压喷头，两种溶液混合生成二氧化氯，即可用于消毒。**JET 表面消毒液**配方含有非离子表面活性剂，以增强清洁性能。二氧化氯 ClO_2 通过破坏微生物分子结构，从而实现杀灭。基于此机制，有害微生物无法对二氧化氯 ClO_2 产生耐药性。

告别预浸塑料擦拭巾

依据欧洲标准 EN 16615 所用标准擦拭巾的有效性验证，**JET 表面消毒液**可与任何干擦拭巾搭配使用。使用超细纤维布或不含塑料的干擦拭巾，即可制成杀芽孢擦拭巾。

符合欧盟及本地标准验证：1分钟高效杀灭多种有害微生物

芽孢/细菌芽孢	**EN 17126、EN 17846、《消毒技术规范》（卫生部 2002 年版）第二部分 — 2.1.1.9、2.1.2.2、2.1.2.9**
分枝杆菌	**EN 14348、《消毒技术规范》（卫生部 2002 年版）第二部分 — 2.1.1.8**
病毒	**EN 14476、《消毒技术规范》（卫生部 2002 年版）第二部分 — 2.1.1.10**
酵母菌/真菌	**EN 13624、EN 16615 及《消毒技术规范》（卫生部 2002 年版）第二部分 — 2.1.1.9**
细菌	**EN 13727、EN 16615 及《消毒技术规范》（卫生部 2002 年版）第二部分 — 2.1.1.7.4、2.1.2.9**

Clostridioides difficile 艰难梭菌	*Enterococcus hirae* 海氏肠球菌
Bacillus subtilis 蜡样芽孢杆菌	*Proteus vulgaris* 普通变形杆菌
Bacillus cereus 艰难梭菌	*Staphylococcus aureus* 金黄色葡萄球菌
Adenovirus Type 5 5 型腺病毒	*Streptococcus pyogenes* 酿脓链球菌
Hepatitis B Virus (HBV) 乙肝病毒	Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) *Klebsiella pneumoniae* 耐碳青霉烯类 (CRE) 肺炎克雷伯菌
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 人类免疫缺陷病毒 HIV	
Influenza A Virus (H1N1) 甲型流感病毒	Extended Spectrum Beta-Lactamase *Klebsiella pneumoniae* (ESBL) 超广谱β-内酰胺酶 (ESBL) 肺炎克雷伯菌
Murine Norovirus 鼠诺如病毒	
Poliovirus Type 1 1 型脊髓灰质炎病毒	Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA)
Bovine Coronavirus 牛冠状病毒	Multidrug-resistant *Acinetobacter baumannii* (MDRAB) 多重耐药鲍曼不动杆菌 (MDRAB)
Aspergillus brasiliensis 黑曲霉菌	
Candida albicans 白色念珠菌	Vancomycin-resistant Enterococci (VRE) *Enterococcus faecium* 耐万古霉素肠球菌 (VRE)
Candidozyma auris (formerly *Candida auris*) 耳念珠菌	

仅展示欧盟标准验证的微生物；完整微生物杀灭清单请参阅《微生物有效性汇总》。

操作简便：取用、擦拭、等待

每瓶 800ml，每箱 4 瓶。



JET™


1分钟高效杀芽孢消毒剂

JET 表面消毒液是一款采用二氧化氯技术的杀芽孢泡沫型消毒剂。每次轻按喷头，泡沫即可用于对微生物高风险表面进行消毒处理。

JET 表面消毒液采用非气溶胶熔喷布技术，避免液体在空气中循环散播。作为您的医疗器械表面消毒的伙伴，**JET 表面消毒液**适用于患者床旁区域及诊疗室的表面消毒。*

*使用前请参阅产品使用说明。不适用于侵入式医疗器械。





英国制造

有效去除生物膜

采用二氧化氯 ClO_2 的具杀芽孢效力消毒剂

无气溶胶产生

1分钟快速起效

Tristel Surfaces™

中国：雀艾斯达医疗器械（上海）有限公司
邮箱： 888@tristel.com
电话： +86 (21) 8016 2555

www.tristel.com.cn

安全使用杀菌剂。在使用前请详细阅读产品标签及具体信息。

立即扫码获取更多资讯


Copyright © Tristel Solutions Limited
Mkt-Bro-3408 - V1
12/MAY/2026

为什么选择可杀灭芽孢的表面消毒剂?

在医院独立病房、隔离区域和特别加护病房，存在大量高频接触表面。

艰难梭菌、金黄色葡萄球菌（包含耐甲氧西林金黄色葡萄球菌）、耳念珠菌及铜绿假单胞菌等病原体可在表面存活数天乃至数周，增加患者与医护人员的传播风险。[1,2]

杀芽孢表面消毒是主动预防疫情暴发的关键措施，尤其针对如艰难梭菌等多重耐药微生物。



风险区域

潜在感染风险区域

可对病患产生感染风险的区域：

- 普通病房
- 门诊部
- 放射科
- 物理治疗室
- 卫生设施
- 透析中心
- 分娩室
- 功能诊断区
- 精神科病房
- 介入手术室
- 急诊科
- 患者转运车辆

较高感染风险区域

用于管理高传染性疾病的专设区域：

- 用于结核病（TB）等患者的隔离病房

感染风险**增高**区域

这些区域涉及易受感染的病患，导致风险显著增高：


- 手术室
- 重症监护室及普通监护室
- 移植科室
- 烧伤治疗中心
- 肿瘤科
- 新生儿重症监护室（NICUs）

医护人员感染风险较高区域

由于工作性质，这些环境对医护人员的感染风险更高：

- 病理学/微生物学实验室
- 消毒供应中心（CSSD）
- 科研实验室
- 疾控中心实验室

医疗机构内需频繁清洁与消毒的高接触表面:



1. Soroush Borji, Mosayeb Rostamian, Sepide Kadivarian, Kooti, S., Shirin Dashtbin, Somayeh Hosseinabadi, Ramin Abiri and Amirhooshang Alvandi (2022). Prevalence of Clostridioides difficile contamination in the healthcare environment and instruments: A systematic review and meta-analysis. Germs, [online] 12(3), pp.361–371. doi:https://doi.org/10.18683/germs.2022.1340.

2. Suleyman, G., Alangaden, G. and Bardossy, A.C. (2018). The Role of Environmental Contamination in the Transmission of Nosocomial Pathogens and Healthcare-Associated Infections. Current Infectious Disease Reports, 20(6). doi:https://doi.org/10.1007/ s11908-018-0620-2.